

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК

Новорожденные

- первые 24 часа жизни** > Гепатит В (1)
- 3-7 дней** > Туберкулез (1)
- 1 месяц** > Гепатит В (2)
- 2 месяц** > Гепатит В (3)
для детей из групп риска
- 3 месяц** > Дифтерия, коклюш, столбняк (1)
Гемофильная инфекция (1)
Полиомиелит (1)
- 4,5 месяца** > Дифтерия, коклюш, столбняк (2)
Гемофильная инфекция (2)
Полиомиелит (2)
- 6 месяцев** > Дифтерия, коклюш, столбняк (3)
Гемофильная инфекция (3)
Полиомиелит (3), Гепатит В (3)
- 12 месяцев** > Корь (1), краснуха (1), гепатит В (4)
эпидемический паротит (1)
- 18 месяцев** > Дифтерия, коклюш, столбняк (4)
Полиомиелит (4)
Гемофильная инфекция (4)
- 20 месяцев** > Полиомиелит (5)



Министерство здравоохранения
Удмуртской Республики

- 6 лет** > Корь, краснуха,
эпидемический паротит (2)
- 7 лет** > Дифтерия, столбняк (5)
Туберкулез (2)
- 14 лет** > Дифтерия, столбняк (6)
Туберкулез (3) Полиомиелит (6)
- Взрослые** > Дифтерия, столбняк
каждые 10 лет

ПРАВИЛА ВАКЦИНАЦИИ



Памятка разработана БУЗ УР
«Республиканский центр медицинской профилактики
МЗ УР» при участии Филиала «Удмуртский»
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»

Вакцинация

- это введение ослабленных или убитых микробов или их частиц с целью сформировать иммунитет к болезни, который предотвратит заражение и предупредит развитие серьезных осложнений. При этом организм «переболевает» инфекцией в легкой форме.

Соблюдение несложных правил позволит избежать или значительно уменьшить риск вероятных поствакцинальных осложнений.

До прививки

Здоровому ребенку не требуется специальной подготовки к прививке.

За 2-3 дня до вакцинации желательно избегать мест массового скопления людей, чтобы случайно не «подцепить» вирусную инфекцию. Гостей тоже лучше отложить.

Детям до 1 года не следует перед прививкой вводить в рацион новый продукт питания. Не кормите ребенка за 1 час до прививки и сразу после неё.

За неделю до прививки рекомендуется особенно тщательно следить за регулярностью стула у ребенка, так как наличие запора значительно увеличивает риск побочных реакций после прививок.

Не рекомендуется делать прививки сразу после возвращения из длительной поездки, особенно, если резко менялся климат, так как это создает условия для заболеваний.

О чем необходимо предупредить врача:

- О повышении у ребёнка температуры в дни, предшествующие вакцинации или наличие других признаков нездоровья: кашель, насморк и т.д.

- О наличии у ребенка хронических заболеваний, аллергических реакций на пищу или лекарства.

- О приеме лекарственных препаратов.
- О реакции на предыдущие прививки (повышение температуры и др.)

В день прививки

Вакцинация проводится только после осмотра ребенка врачом. Врач разъясняет родителям, какие реакции на прививку могут возникнуть и когда, а также – в каких случаях обращаться за медицинской помощью. Родители дают письменное согласие на прививку.

Посоветуйтесь с врачом, какое жаропонижающее средство и в какой форме (сироп, свечи, таблетки и т.д.) необходимо иметь дома на случай повышения температуры у ребенка.



В первые 30 минут после прививки не торопитесь покинуть поликлинику. Посидите неподалеку от кабинета или погуляйте рядом с поликлиникой. Это поможет успокоиться и позволит быстро оказать помощь в случае возникновения непредсказуемых немедленных аллергических реакций на прививку.

Купание, физкультурные занятия в день прививки лучше отложить. Если самочувствие ребёнка хорошее, то с ним можно и нужно гулять.



Первые 3 дня после прививки

Следите за температурой тела ребенка. В течение 2-3 суток может быть небольшое повышение температуры, вялость, раздражительность. Если у ребенка поднялась температура выше 38,5 – дайте жаропонижающее средство, обильно поите, не настаивайте на кормлении. В месте введения вакцины может появиться краснота и уплотнение, которые должны пройти через 1-3 дня.

Нежелательно путешествовать с ребенком сразу после прививки. Лучше подумать о прививках заранее, за 2-3 недели до отъезда.

Через 5-12 дней после прививки

В случае прививки живыми вакцинами (корь, краснуха, паротит, полиомиелит) повышение температуры бывает на 5-12 сутки после прививки. Возможны и другие реакции на прививку.

При введении коревой вакцины - насморк, боль в горле, покашливание, конъюнктивит, небольшая сыпь.

При введении краснушной вакцины - кратковременная сыпь.

При введении паротитной вакцины - небольшое увеличение околоушных слюнных желез. **Эти симптомы проходят самостоятельно без лечения через несколько дней.**

